

جراحة

<p>2- تنجم معظم الوفيات لدى المصابين بأذيات البنكرياس عن :</p> <p>a. خراجات البنكرياس b. كيسات بنكرياس كاذبة c. نواسير البنكرياس d. نواسير عفج e. <u>أذيات الأوعية المرافقة .</u></p>	<p>1- من العلامات السريرية لخلع الورك الولادي مايلي عدا:</p> <p>a. قصر الطرف مع دوران خارجي b. تحدد تباعد الورك المصاب c. عدم تناظر الثنيات الجلدية d. <u>إيجابية طقة اورتولاني حتى 12 شهر</u> e. زيادة عرض العجان في الحالات ثنائية الجانب</p>
<p>4- كل ما يلي صحيح بالنسبة للبواسير الداخلية ماعدا:</p> <p>a. تتوضع فوق الخط المسنن . b. تتألف من توسعات وريدية . c. تقسم إلى أربع درجات. d. للوراثة دور في الحدوث e. تتظاهر بنزف ونز مخاطي .</p>	<p>3- مريض بعمر 40 سنة راجع بأعراض ألم في الناحية الشرجية منذ 24 ساعة يزداد بالمشي وأثناء التغوط مع ارتفاع للحرارة وذلك لأول مرة ، التشخيص المبدئي ؟</p> <p>a. <u>خراج حول الشرج ناتج عن التهاب غدد هيومان.</u> b. خراج حول الشرج ناتج عن انتان شق شرجي. c. خراج حول الشرج ناتج عن داء كرون . d. خراج حول الشرج ناتج عن التهاب كولون قرصي. e. خراج حول الشرج ناتج عن سرطان قناة شرجية.</p>
<p>6- في الفتوق السرية عند الاطفال كل ما يلي صحيح ما عدا:</p> <p>a. الآلية خلقية b. <u>تتعرض بكثرة للاختناق</u> c. قد تغلق عفويا d. عادة تجرى الجراحة بعمر 2 سنة اذا لم تغلق عفويا e. قد ترافق مع قصور الدرق</p>	<p>5- من اختلاطات الخصية المهاجرة كل ما يلي ما عدا:</p> <p>a. الانفتال b. التسرطن c. القابلية للرض d. العقم في الحالات المزدوجة e. <u>حدوث دوالي حبل منوي</u></p>
<p>8- كل مما يلي صحيح حول فتق السرة ما عدا:</p> <p>a. تعتبر الفتوق السرية شائعة الحدوث. b. البدانة والحمول من العوامل المؤهبة مثل الحين. c. فتق السرة عند الكهول مكتسب عادة عكسه عند الأطفال ولادي المنشأ. d. <u>تعالج عند الكهول بالخياطة البسيطة.</u> e. تحدث عند النساء أكثر من الرجال.</p>	<p>7 - في اليرقان الانسدادي:</p> <p>a. يرتفع S.G.O.T b. يرتفع S.G.P.T c. يرتفع البليروبين غير المباشر d. <u>ترتفع الفوسفاتاز القلوية .</u> e. يرتفع زمن البروترومين</p>
<p>10- كل التالي هو من اختلاطات استئصال الطحال ماعدا :</p> <p>a. توسع معدة حاد b. خراج تحت الحجاب c. ناسور بنكرياسي d. النزف بعد العمل الجراحي e. <u>نقص في الصفائح</u></p>	<p>9- أي من الأمراض الجراحية التالية هي أكثر قابلية للنكس بعد العمل الجراحي:</p> <p>a. القرحة العفجية b. الفتوق الاربية c. <u>ناسور حول الشرج</u> d. كتلة في الثدي e. عمليات الطرق الصفراوية</p>