

نسائية وتوليد

<p>2- خلال الزيارات الدورية يجرى للحامل بشكل روتيني ما يلي عدا:</p> <p>a. قياس الوزن - الطول - الضغط الشرياني .</p> <p>b. عيار حضاب الدم - فحص البول و الراسب .</p> <p>c. عيار اعداد الحصبة الالمانية .</p> <p>d. <u>فحص مهبلي في كل زيارة</u></p> <p>e. تصوير بالامواج فوق الصوتية .</p>	<p>1- من فوائد موانع الحمل الفموية كل مايلي عدا:</p> <p>a. انقاص نسبة فقرالدم بعوز الحديد</p> <p>b. <u>انقاص نسبة سرطان عنق الرحم</u></p> <p>c. انقاص نسبة سرطان المبيض</p> <p>d. معالجة عسرة الطمث</p> <p>e. معالجة النزف الطمثي</p>
<p>4- من موقوفات المخاض التي قد تؤدي الى انغلاق القناة الشريانية الباكر، اجابة واحدة صحيحة:</p> <p>a. هيدروكلوريد ريتودرين</p> <p>b. <u>اندوميثاسين</u></p> <p>c. <u>نفيديين</u></p> <p>d. سلفات المغنيزيوم</p> <p>e. ريتودرين</p>	<p>3- من الاختلاطات الباكرة عند الوليد الخديج عدا:</p> <p>a. متلازمة الضائقة التنفسية RDS</p> <p>b. بقاء القناة الشريانية مفتوحة</p> <p>c. <u>كسور الترقوة</u></p> <p>d. <u>النزف ضمن البطنيات الدماغية</u></p> <p>e. انتان الدم</p>
<p>6- الخروس المسنة - تكون عرضة أكثر لما يلي عدا :</p> <p>a. الإجهاض Abortion</p> <p>b. اقباءات حملية متعددة .</p> <p>c. نسبة حدوث أعلى للشذوذات الصبغية بما فيها متلازمة داون .</p> <p>d. <u>المشيمة المنزاحة .</u></p> <p>e. ارتفاع معدل إجراء العملية القيصرية</p>	<p>5- أسباب المجيء المعترض كل مايلي عدا:</p> <p>a. الحمل التوأمي.</p> <p>b. تشوهات الرحم الخلقية .</p> <p>c. المشيمة المنزاحة.</p> <p>d. <u>انفكاك المشيمة الباكر .</u></p> <p>e. <u>الاستسقاء الامنيوسي Ascites amniotic</u></p>
<p>8- في الدورة الطمثية، كل مايلي صحيح عدا :</p> <p>a. قد يغيب الطمث في حالات الشدة النفسية</p> <p>b. ينتج الاستروجين من الخلايا الحبيبية في الجريبات</p> <p>c. ينتج البروجسترون بعد حدوث الاباضة</p> <p>d. الجسم الاصفر هو نفسه جريب دوغراف المتمزق</p> <p>e. <u>يقع الطور الجريبي تحت تأثير هرمون LH</u></p>	<p>7- في أورام المبيض الحبيبة نجد كل مايلي عدا:</p> <p>a. <u>العلاج الجراحي الجذري كاف لوحده</u></p> <p>b. <u>الفحص العياني للورم غير كاف لتقدير الحبات</u></p> <p>c. التنتبات الداخلية مع وجود الحين علامات سيئة</p> <p>d. لا تكشف باكراً لكونها تنمو خلسة وبجربة</p> <p>e. <u>قد يكون لها علاقة وراثية</u></p>
<p>10- كل مما يلي يعد من العوامل المؤهبة للحمل الهاجر، عدا :</p> <p>a. التهاب ملحققات متكرر .</p> <p>b. كتلة تضغط على البوق.</p> <p>c. <u>ربط البوقين .</u></p> <p>d. <u>التهاب زائدة دودية Appendicitis مع مضاعفات .</u></p> <p>e. جراحة تصنيعية على البوقين .</p>	<p>9- الاستطباب الأساسي لطفل الأنبوب في العقم هو:</p> <p>a. <u>اللاإباضة المزممة.</u></p> <p>b. <u>الأورام الليفية الرحمية.</u></p> <p>c. <u>إنتانات عنق الرحم المزممة.</u></p> <p>d. <u>تشوهات الرحم الخلقية.</u></p> <p>e. <u>انسداد البوقين.</u></p>
<p>12- تعتبر القيصرية استطباب مطلق فيما يلي عدا:</p> <p>a. عدم التناسب الحوضي الجنيني</p> <p>b. <u>المجبيء المقعدي</u></p> <p>c. <u>المجبيء الجبهي</u></p> <p>d. سوابق أكثر من قيصرية</p> <p>e. <u>مجبيء وجهي ذقني خلفي</u></p>	<p>11- الإجراء الأول لدى فتاة تشكو من غياب طمث بدئي :</p> <p>a. إجراء تحاليل هرمونية للنخامة</p> <p>b. <u>تحري العلامات الجنسية الثانوية وغشاء البكارة .</u></p> <p>c. طلب صورة شعاعية لتقدير العمر العظمي .</p> <p>d. طلب ايكو غرافي للحوض الصغير .</p> <p>e. طلب تحليل حمل .</p>